

## Liste des indicateurs SENS

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
<b>Enfants de 6 - 59 mois</b>						
<b>Malnutrition aiguë (Standards de croissance OMS 2006)</b>						
Malnutrition aiguë globale (MAG)	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS et / ou qui présentent des oedèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et âge (émaciation uniquement : 6-17,99; 18-29,99; 30-41,99; 42-53,99; 54-59,99 mois)	Critique si ≥ 15% ; Cible <10%
Malnutrition aiguë modérée (MAM)	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins deux écarts-type et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
Malnutrition aiguë sévère (MAS)	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS et / ou qui présentent des oedèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
Œdèmes	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant des oedèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	-	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Nominateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
<b>Périmètre brachial (PB)</b>						
PB < 125 mm et/ou oedèmes	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 125mm et / ou présentant des oedèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et âge (6-17,99; 18-29,99; 30-41,99; 42-53,99; 54-59,99 mois)	-
PB 115-124 mm	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 125mm et supérieure ou égale à 115mm	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
PB < 115 mm et/ou oedèmes	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 115mm et / ou présentant des oedèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
<b>Insuffisance pondérale (Standards de croissance OMS 2006)</b>						
Insuffisance pondérale globale	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	Critique si ≥ 30%
Insuffisance pondérale modérée	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins deux et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
Insuffisance pondérale	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont	Nombre total	Désagrégation par sexe; âge	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
sévère			l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	d'enfants âgés de 6 à 59 mois	jusqu'à 59,99 mois	
<b>Retard de croissance (Standards de croissance OMS 2006)</b>						
Retard de croissance global	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et âge (6-17,99; 18-29,99; 30-41,99; 42-53,99; 54-59,99 mois)	Critique si $\geq 40\%$
Retard de croissance modéré	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins deux et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
Retard de croissance sévère	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe; âge jusqu'à 59,99 mois	-
<b>Couverture du programme</b>						
Vaccination contre la rougeole - avec carte (9-59 mois)	%	1	Nombre d'enfants de 9-59 mois ayant reçu un vaccin contre la rougeole -- confirmation d'après carte	Nombre total d'enfants âgés de 9 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	Cible $\geq 95\%$
Vaccination contre la rougeole - avec carte ou de mémoire (9-59 mois)	%	1	Nombre d'enfants de 9-59 mois ayant reçu un vaccin contre la rougeole -- confirmation d'après carte ou de	Nombre total d'enfants âgés de 9 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	Cible $\geq 95\%$

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
			mémoire			
Supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois - avec carte	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant reçu une capsule de haute teneur en vitamine A au cours des 6 derniers mois --confirmation d'après carte	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois. Ne pas inclure si pas de campagne de supplémentation en vitamine A dans les 6 mois passés.	Cible ≥ 90%
Supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois - avec carte ou de mémoire	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant reçu une capsule de haute teneur en vitamine A au cours des 6 derniers mois --confirmation d'après carte ou de mémoire	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois. Ne pas inclure si pas de campagne de supplémentation en vitamine A dans les 6 mois passés.	Cible ≥ 90%
Programme d'alimentation supplémentaire (ex : CRENAM)	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant une MAM selon les critères du programme d'alimentation supplémentaire et ayant rapporté être inscrits dans le programme	Nombre d'enfants présentant une MAM selon les critères d'admission au programme d'alimentation supplémentaire	La méthode directe est utilisée. Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles. Résultats à rapporter de deux façons --d'après l'ensemble des critères d'admission et d'après le PB de façon isolée. Age jusqu'à 59,99 mois.	Cible ≥ 90%
Programme d'alimentation thérapeutique (ex :	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant une MAS selon les critères du programme d'alimentation	Nombre d'enfants présentant une MAS selon les critères	La méthode directe est utilisée. Attention à l'interprétation : taille	Cible ≥ 90%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
CRENAS)			thérapeutique et ayant rapporté être inscrits dans le programme	d'admission au programme d'alimentation thérapeutique	d'échantillon et précision faibles. Résultats à rapporter de deux façons --d'après l'ensemble des critères d'admission et d'après le PB et / ou œdèmes de façon isolée. Age jusqu'à 59,99 mois.	
<b>Diarrhée</b>						
Diarrhée au cours des 2 dernières semaines	%	1	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	-
<b>Anémie</b>						
Anémie totale (Hb < 11 g/dl)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois); âge jusqu'à 59,99 mois	Élevée si ≥ 40% ; Cible < 20%
Anémie modérée et sévère (Hb < 10)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 10g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	
Légère (Hb 10 -10,9)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl et supérieure ou égale à 10g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	
Modérée (Hb 7 - 9,9)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine	Nombre total d'enfants âgés de 6 à	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
			inférieure à 10g/dl et supérieure ou égale à 7g/dl	59 mois		
Sévère (Hb < 7)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 7g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	
Hb moyenne	g/dl	2	Somme des concentrations en hémoglobine exprimées en g/dl chez les enfants de 6-59 mois	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	
<b>Enfants 0-23 mois</b>						
<b>Indicateurs ANJE</b>						
Initiation opportune de l'allaitement	%	3	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant été mis au sein au cours de la première heure après la naissance	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois	-
Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois	%	3	Nombre de nourrissons de 0-5 mois n'ayant reçu que du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total de nourrissons de 0-5 mois	Tranche d'âge-cible : 0-5,99 mois. Lait maternel uniquement et pas d'autres liquides ou solides autorisés, pas même l'eau, à l'exception des gouttes ou sirops tels que vitamines, suppléments minéraux ou médicaments.	-
Continuation de l'allaitement à 1 an	%	3	Nombre d'enfants de 12-15 mois ayant reçu du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 12-15 mois	Tranche d'âge-cible : 12-15,99 mois. Attention à l'interprétation : taille	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
					d'échantillon et précision faibles.	
Continuation de l'allaitement à 2 ans	%	3	Nombre d'enfants de 20-23 mois ayant reçu du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 20-23 mois	Tranche d'âge-cible : 20-23,99 mois. Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles.	-
Introduction des aliments solides, semi-solides ou mous	%	3	Nombre d'enfants de 6-8 mois ayant reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant la journée précédente	Nombre total de nourrissons de 6-8 mois	Tranche d'âge-cible : 6-8,99 mois. Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles.	-
Consommation d'aliments riches en fer ou enrichis en fer	%	3	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu des aliments riches en fer ou enrichis en fer et élaborés spécifiquement pour les nourrissons et les jeunes enfants, ou une nourriture enrichie à la maison avec un produit qui comprenait du fer durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois	-
Alimentation au biberon	%	3	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant été alimentés au biberon durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
<b>Prévalence des apports (si applicable)</b>						
Proportion d'enfants âgés de 0 à 23 mois recevant du lait maternisé (enrichi ou non)	%	3	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant reçu du lait maternisé (quel que soit le type) durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant un Aliment Composé Enrichi (ACE)	%	3	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un ACE durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas d'ACE dans le contexte. Utiliser le nom local de l'ACE.	-
Proportion d'enfants de 6-23 mois recevant un ACE++	%	3	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un ACE++ durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas d'ACE++ dans le contexte. Utiliser le nom local de l'ACE++.	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant des suppléments nutritionnels à base de lipides (SNL)	%	3	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un SNL durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas de SNL dans le contexte. Utiliser le nom local du supplément.	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant une poudre de micronutriments (MNP)	%	3	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une poudre de micronutriments durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas de MNP dans le contexte. Utiliser le nom local de la MNP.	-



Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
<b>FEMMES de 15-49 ans</b>						
<b>Anémie (femmes non-enceintes)</b>						
Anémie totale (Hb <12 g/dl)	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 12g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes.	Élevée si $\geq 40\%$ ; Cible < 20%
Légère (Hb 11-11,9)	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 12g/dl et supérieure ou égale à 11g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes.	-
Modérée (Hb 8-10,9)	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl et supérieure ou égale à 8g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes.	-
Sévère (Hb <8)	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 8g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes.	-
Hb moyenne	g/dl	2	Somme des concentrations en hémoglobine exprimées en g/dl chez les femmes de 15-49 ans	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes	-
<b>Couverture du programme (femmes enceintes)</b>						
Actuellement enrôlées dans un programme de soins prénataux	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement enrôlées dans un programme de soins prénataux	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles.	-
Recevant actuellement des comprimés de fer-	%	2	Nombre de femmes de 15-49 ans recevant actuellement des comprimés	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
acide folique			de fer-acide folique		précision faibles.	
<b>SÉCURITÉ ALIMENTAIRE</b>						
<b>Distribution de vivres</b>						
Proportion de ménages avec carte de ration	%	4	Nombre de ménages possédant une carte de ration	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des rations de vivres sont distribuées.	-
Durée moyenne - en nombre de jours - de la ration alimentaire	jours	4	Somme pour l'ensemble des ménages des périodes (exprimées en nombres de jours) pendant lesquelles les rations alimentaires ont duré	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. Dans les contextes où les distributions de rations complètes et de demi-rations coexistent, ne rapporter cette valeur que pour les ménages recevant une ration complète.	-
Rapport durée moyenne de la ration/durée théorique	%	4	Moyenne (c'est-à-dire le nombre moyen de jours) qu'a duré la ration alimentaire depuis le dernier cycle complet	Durée théorique de la ration (en jours)	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des rations alimentaires sont distribuées.	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de ménages déclarant une durée de la ration alimentaire s'étendant sur la totalité du cycle	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré que la durée de la ration alimentaire s'est étendue sur la totalité du dernier cycle	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des rations alimentaires sont distribuées.	-
Proportion de ménages déclarant que la ration alimentaire a duré :						
≤75% du cycle [INSÉRER Nb de JOURS]	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré que la durée de la ration alimentaire s'est étendue sur 75% ou moins de la durée théorique du dernier cycle	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des rations alimentaires sont distribuées.	-
>75% du cycle [INSÉRER Nb de JOURS]	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré que la durée de la ration alimentaire s'est étendue sur plus de 75% de la durée théorique du dernier cycle	Nombre total de ménages		
<b>Stratégies d'adaptation néfastes</b>						
Proportion de ménages déclarant utiliser les stratégies d'adaptation suivantes au cours du mois dernier :						

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Emprunt d'argent liquide, nourriture ou autres, avec ou sans intérêts	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré avoir emprunté de l'argent, de la nourriture ou autre chose, avec ou sans intérêts au cours du mois dernier	Nombre total de ménages	Indicateurs standards spécifiques aux enquêtes UNHCR	-
Vente de biens qui auraient normalement été conservés (meubles, stocks de semences, outils, autres articles non alimentaires, bétail, etc.)	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré avoir vendu des biens qu'ils n'auraient normalement pas cédés (meubles, stocks de semences, outils, autres articles non alimentaires, bétail, etc.) au cours du mois dernier	Nombre total de ménages		
Demandes de transferts d'argent ou dons plus élevés que la normale	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré avoir demandé des transferts d'argent ou dons plus élevés que la normale au cours du mois dernier	Nombre total de ménages		
Réduction de la quantité et / ou fréquence des repas	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré avoir réduit la quantité et / ou fréquence des repas au cours du mois dernier	Nombre total de ménages		
Mendicité	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré avoir fait de la mendicité au cours du mois dernier	Nombre total de ménages		
Engagement dans des activités potentiellement dangereuses [LISTER LES ACTIVITÉS]	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré s'être engagés dans des activités potentiellement dangereuses au cours du mois dernier	Nombre total de ménages		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de ménages déclarant n'avoir utilisé aucune de ces stratégies d'adaptation au cours du mois dernier	%	4	Nombre de ménages ayant déclaré n'avoir utilisé aucune de ces stratégies d'adaptation au cours du mois dernier	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
<b>Diversité alimentaire au sein du ménage</b>						
SDA moyen	groupe alimentaire	4	Somme des groupes alimentaires consommés parmi les 12 durant la journée précédente par l'ensemble des ménages	Nombre total de ménages	Spécifier dans le rapport final la date à laquelle la distribution générale de vivres s'est terminée par rapport au début de la collecte des données d'enquête.	
Proportion de ménages n'ayant consommé aucun légume, fruit, viande, œufs, poisson / fruits de mer, ou lait / produits laitiers	%	4	Nombre de ménages <i>n'ayant consommé aucun</i> légume, fruit, viande, œufs, poisson / fruits de mer, ou lait / produits laitiers durant la journée précédente	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
Proportion de ménages consommant une source végétale ou animale de vitamine A	%	4	Nombre de ménages ayant consommé une source végétale ou animale de vitamine A durant la journée précédente	Nombre total de ménages	-	-
Proportion de ménages consommant de la viande	%	4	Nombre de ménages ayant consommé de la viande (abats ou chair) ou du	Nombre total de ménages	-	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
(abats ou chair) ou du poisson / fruits de mer (sources alimentaires de fer héminique)			poisson / fruits de mer (sources alimentaires de fer héminique) durant la journée précédente			
<b>EAH</b>						
<b>Qualité de l'eau</b>						
Proportion de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée	%	5	Nombre de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée	Nombre total de ménages	-	-
Proportion de ménages utilisant un récipient couvert ou à goulot étroit pour stocker leur eau potable	%	5	Nombre de ménages utilisant un récipient couvert ou à goulot étroit pour stocker leur eau potable	Nombre total de ménages	-	-
<b>Quantité d'eau</b>						
Proportion de ménages utilisant :						
≥ 20 lpppj	%	5	Nombre de ménages utilisant une quantité d'eau supérieure ou égale à 20 litres par personne durant la journée précédente	Nombre total de ménages	-	Quantité moyenne d'eau disponible par personne/jour ≥ 20 litres
15 - <20 lpppj	%	5	Nombre de ménages utilisant une quantité d'eau inférieure à 20 et supérieure ou égale à 15 litres par	Nombre total de ménages		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
			personne durant la journée précédente			
<15 lpppj	%	5	Nombre de ménages utilisant moins de 15 litres par personne durant la journée précédente	Nombre total de ménages		
Consommation moyenne d'eau	Litre / pers. /jour	5	Somme sur l'ensemble des ménages de la quantité d'eau consommée (en litres) par personne par jour	Nombre total de ménages	-	-
<b>Satisfaction par rapport à l'approvisionnement en eau</b>						
Proportion de ménages se disant satisfaits de l'approvisionnement en eau de boisson	%	5	Nombre de ménages se disant satisfaits de l'approvisionnement en eau de boisson	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
<b>Élimination hygiénique des excréta</b>						
<b>Proportion de ménages utilisant :</b>						
Un système amélioré d'élimination des excréta (toilettes améliorées, non partagées)	%	5	Nombre de ménages utilisant un système amélioré et non partagé d'élimination des excréta	Nombre total de ménages	-	-
Des toilettes familiales partagées (toilettes améliorées, partagées entre 2	%	5	Nombre de ménages utilisant des toilettes améliorées partagées entre 2 ménages seulement	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
ménages seulement)						
Des toilettes communes (toilettes améliorées, partagées entre 3 ménages ou plus)	%	5	Nombre de ménages utilisant des toilettes améliorées partagées entre 3 ménages ou plus	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	
Toilettes non améliorées (toilettes non améliorées ou toilettes publiques)	%	5	Nombre de ménages utilisant des toilettes non améliorées ou des toilettes publiques	Nombre total de ménages	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	
Proportion de ménages ayant des enfants de moins de 3 ans et qui éliminent leurs selles de façon hygiénique	%	5	Nombre de ménages ayant au moins un enfant de moins de 3 ans et qui éliminent leurs selles de façon hygiénique	Nombre total de ménages ayant au moins un enfant de moins de 3 ans	-	-
<b>COUVERTURE EN PROVISION DE MOUSTIQUAIRES</b>						
<b>Possession d'une moustiquaire</b>						
Proportion de ménages possédant au moins une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre de ménages possédant au moins une moustiquaire (tous types confondus)	Nombre total de ménages	-	-
Proportion de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue	%	6	Nombre de ménages possédant au moins une MILD	Nombre total de ménages	-	Cible >80%



Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
durée (MILD)						
Nombre moyen de MILD par ménage	Nombre	6	Somme de toutes les MILD sur l'ensemble des ménages	Nombre total de ménages		-
Nombre moyen de personnes par MILD	Nombre	6	Nombre total de membres sur l'ensemble des ménages	Somme de toutes les MILD sur l'ensemble des ménages	-	2 personnes par MILD
<b>Utilisation des moustiquaires</b>						
Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) au sein du ménage	%	6	Nombre de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) au sein du ménage la nuit passée	Nombre total de personnes sur l'ensemble des ménages	-	-
Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une MILD au sein du ménage	%	6	Nombre de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une MILD au sein du ménage la nuit passée	Nombre total de personnes sur l'ensemble des ménages	-	-
Proportion d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) la nuit passée	Nombre total d'enfants de 0-59 mois	-	-
Proportion d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une MILD	%	6	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une MILD la nuit passée	Nombre total d'enfants de 0-59 mois	-	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) la nuit passée	Nombre total de femmes enceintes	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles.	-
Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une MILD	%	6	Nombre de femmes enceintes ayant dormi sous une MILD la nuit passée	Nombre total de femmes enceintes	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles.	-
<b>Pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent (FACULTATIF)</b>						
Proportion de ménages ayant bénéficié d'une pulvérisation intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent	%	6	Nombre de ménages déclarant ayant bénéficié d'une campagne de pulvérisations intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent (dans leur maison)	Nombre total de ménages	À rapporter seulement si une campagne de pulvérisations intradomiciliaire d'insecticide à effet rémanent a été mise en œuvre au cours des 6 derniers mois.	-