

ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SENS NUTRITION

(Région, pays du camp, etc.)

Enquête conduite en : (mois, année)

Coordonnée par le HCR avec l'appui technique de **(nom des agences impliquées)**

Un modèle de rapport préliminaire est disponible. Voir l'**outil 17 du pré-module SENS - Zimbabwe SENS Rapport Préliminaire 2012** (disponible en anglais seulement)

- Contexte
- Zone enquêtée, type de population, chiffres de population (totale, <5ans)
- Dates de l'enquête
- Objectifs de l'enquête
- Méthodologie utilisée (échantillonnage, taille de l'échantillon, indicateurs principaux)
- Résumé des principaux résultats
- Brève interprétation des résultats
- Comparaisons (tendances) avec les années précédentes (si applicable)
- Orientations à discuter au niveau des programmes au vu des premiers résultats

TABLEAU 1 RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS

	Nombre/ total	% (IC 95%)	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique (si applicable)
ENFANTS 6-59 mois			
Malnutrition aiguë (Standards de croissance OMS 2006)			
Malnutrition aiguë globale (MAG)			Critique si $\geq 15\%$
Malnutrition aiguë modérée (MAM)			
Malnutrition aiguë sévère (MAS)			
Oedèmes			
Retard de croissance (Standards de croissance OMS 2006)			
Retard de croissance total			Critique si $\geq 40\%$
Retard de croissance sévère			
Couverture programme			
Vaccination anti-rougeole selon carte ou de mémoire (9-59 mois)			Cible $\geq 95\%$
Supplémentation en vitamine A dans les derniers 6 mois selon carte ou de mémoire			Cible $\geq 90\%$
Diarrhée			
Diarrhée au cours des 2 dernières semaines			

	Nombre/ total	% (IC 95%)	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique (si applicable)
Anémie			
Anémie totale (Hb <11 g/dl)			Élevée si ≥ 40%
Légère (Hb 10-10,9)			
Modérée (Hb 7-9,9)			
Sévère (Hb <7)			
ENFANTS 0-23 mois			
Indicateurs ANJE			
Allaitement exclusif jusqu'à 6 mois			
FEMMES de 15-49 ans			
Anémie (femmes non-enceintes)			
Anémie totale (Hb <12 g/dl)			Élevée si ≥ 40%
Légère (Hb 11-11,9)			
Modérée (Hb 8-10,9)			
Sévère (Hb <8)			
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE			
Distribution de vivres			
Proportion de ménages avec carte de ration			
Durée moyenne --en nombre de jours-- de la ration alimentaire sur un cycle de [insérer cycle] jours ¹			
EAH			
Qualité de l'eau			
Proportion de ménages utilisant une source d'eau de boisson améliorée			
Quantité d'eau			
Proportion de ménages utilisant:			Quantité moyenne d'eau disponible par personne/jour ≥ 20 litres
≥ 20 lpppj			
15 - <20 lpppj			
<15 lpppj			
Élimination sécuritaire des excréta			
Proportion de ménages utilisant:			
Un système amélioré d'élimination des excréta (toilettes améliorées, non partagées)			
Des toilettes familiales partagées (toilettes améliorées, partagées entre 2 ménages seulement)			
Des toilettes communes (toilettes améliorées, partagées entre 3 ménages ou plus)			
Toilettes non améliorées (toilettes non améliorées ou toilettes publiques)			

¹ Dans les contextes où les distributions de rations complètes et de demi-rations coexistent, ne rapporter cette valeur que pour les ménages ne recevant une ration complète.

	Nombre/ total	% (IC 95%)	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique (si applicable)
COUVERTURE EN PROVISION DE MOUSTIQUAIRES			
Possession d'une moustiquaire			
Proportion de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue durée (MILD)			Cible >80%
Nombre de personnes par MILD en moyenne			2 personnes par MILD
Pulvérisation intradomestique d'insecticide à effet rémanent			
Proportion de ménages ayant bénéficié d'une pulvérisation intradomestique d'insecticide à effet rémanent			